

乌鱼刺

【别名】地茯苓藤

【来源】百合科菝葜属植物小叶菝葜 *Smilax microphylla* C.H. Wright，以块茎入药。四季可采，洗净切片晒干。

【生境分布】

生态环境：1. 栖息于海底，每年春、夏季之际，从越冬的深处向岛屿附近浅水处洄游。产卵适温为 16-19℃，卵多产在海藻丛中，有黑色胶膜包被，葡萄状，长径 6-7mm，以月余孵出的稚仔，背斑明显，活动性强。肉食性，以甲壳类及小鱼为食。

2. 生态与无针乌贼相似，唯卵子灰白色，梨形，径长 11-12mm，孵化期约需 1 个月，孵出的稚仔背部黄褐色具紫色素与成体相似，但活动力较弱，常潜伏于海底。当年能长成，翌年春季开始产卵，产卵后亲体大多死亡。

3. 生活于近海，有集群性，游泳力强。每年 4 月进行繁殖。

4. 为热闹带外海性种类。

5. 为热带外海性种类。

6. 为热带外海性种类。

资源分布：1. 我国分布于南北沿海，以浙江、福建产量最大。

2. 我国分布于北方沿海，山东南部沿海产量较大。

3. 我国分布于浙江舟山群岛以北沿海。

4. 我国分布于东南沿海。

5. 分布于台湾、福建、广东等沿海。

6. 分布于福建南部及广东沿海。

【性味】甘；微苦；平。

【功能主治】清热解毒，祛湿消肿。用于红崩，白带，颈淋巴结结核，疮疖，跌打损伤。

【用法用量】0.3-1 两。