

无刺根

【出处】出自《全展选编·内科》。

【拼音名】Wú Cì Gēn

【英文名】Canton Ampelopsis Root, Root of Canton Ampelopsis

【别名】赤枝山葡萄、牛牵丝、红血龙、山甜茶、白菇茶、辣梨茶、狮子藤、虾须藤、过山龙、骨疼搜、红脑藤、藤茶、铁甲将军、母猪精藤、田浦茶、背带藤。

【来源】

药材基源：为葡萄科植物广东蛇葡萄的根或全株。

拉丁植物动物矿物名：Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn)

Planch[Cissus cantoniensis Hook. et Arn]。

采收和储藏：全株在夏、秋季采收，洗净，除去杂质，切碎，晒干。秋后挖取根部，洗净，切片，晒干。

【原形态】广东蛇葡萄，木质藤本，全株无毛。茎柔弱，多少被白粉，枝纤细，有条纹；卷须粗壮。一回羽状复叶互生；小叶3-5，或为近二回羽状复叶（即最下1对小叶再各分为三小叶）；小叶近革质，卵形或卵状长圆形，最大的长5-8cm，小的长不及2.5cm，先端急尖或渐尖，基部钝或圆形，有时阔楔形，边缘有不明显的钝齿，下面常被白粉。花两性，三至四回二歧聚伞花序与叶对生或生于小枝顶端，多花；总花梗长4-6cm；花长约2mm；花萼浅杯状，边缘不分裂；花瓣5；雄蕊短，与花瓣同数；花盘明显；花柱短，圆柱状。浆果倒卵状球形，直径5-6mm，熟时深紫色或紫黑色。花期4-7月，果期5-8月。

【生境分布】

生态环境：生于海拔500-1500m的山区灌丛或密林中。

资源分布：分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南等地。

【栽培】

生物学特性：喜温暖而湿润的气候，在稍荫蔽而潮湿的环境中生长健壮，以含腐殖质丰富的砂质壤上栽培为宜。

栽培技术：用种子繁殖或打插繁殖。种子繁殖：秋季果皮变黑时，采收粒大饱满的果实，搓去果皮，将种子晒干。翌年春暖时撒播于苗床上，覆盖细土2cm，浇水，保持苗床湿润，苗高15-20cm时，按行株距100cm×100cm开穴，每穴栽2-3株。

扦插繁殖：在春暖时，植株萌发前，选择二年生枝条，截成15cm长，斜插上中。待生根长叶后即可定植。

田间管理：定植成活后，杂草滋生时，及时中耕除草，追施人畜粪尿。冬季施过磷酸钙与土杂肥。当藤蔓生长至30cm时，搭架，引藤蔓攀援，使植株通风透光。冬季剪去过密的弱枝和枯枝。

【化学成份】全株与叶均含杨梅树皮素(myricetin)，二氢杨梅树皮素

(dihydromyricetin)。

【性味】辛；苦；凉

【归经】心；脾经

【功能主治】祛风化湿；清热解毒。主夏季感冒；风湿痹痛；痈疽肿毒；湿疮湿疹。

【用法用量】内服：煎汤，15-30g。外用：适量，煎水洗，捣烂或研末调敷。

【各家论述】《广西药植名录》：根：消肿毒。全株：清暑热。