

大黄流浸膏原方

【方剂名称】大黄流浸膏原方

【方剂拼音】Dahuang Liujiangao

【方剂组成】本品为大黄加工制成的流浸膏。

【方剂制法】取大黄（最粗粉）1000g，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（《中国药典》附录 I 0），用 60%乙醇作溶剂，浸渍 24 小时后，以每分钟 1-3ml 的速度缓缓渗漉，收集续漉液 850ml，另器保存，继续渗漉，至渗漉液色淡为止，收集续漉液，浓缩至稠膏状，加入初漉液，混合后，用 60%乙醇稀释至 1000ml，静置，俟澄清，滤过，即得。

【功能主治】刺激性泻药，苦味健胃药。用于便秘及食欲不振。

【用法用量】口服，一次 0.5-1ml，一日 1-3ml。

【鉴别】（1）取本品 1ml，加 1%氢氧化钠溶液 10ml，煮沸，放冷，滤过。取滤液 2ml，加稀盐酸数滴使呈酸性，加乙醚 10ml，振摇，乙醚层显黄色，分取乙醚液，加氨试液 5ml，振摇，乙醚层仍显黄色，氨液层显持久的樱红色。（2）取本品 1ml，置瓷坩埚中，在水浴上蒸干后，坩埚上覆以载玻片，置石棉网上直火徐徐加热，至载玻片上呈现升华物后，取下载玻片，放冷，置显微镜下观察，有菱形针状、羽状和不规则晶体，滴加氢氧化钠试液，结晶溶解，溶液显紫红色。

（3）取本品 0.1ml，置水浴上蒸干，加水 20ml 使溶解，滤过，滤液加盐酸 2ml，置水浴上加热 30 分钟，立即冷却，用乙醚 20ml 分 2 次振摇提取，合并乙醚液，蒸干，残渣加氯仿 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大黄对照药材 0.1g，加乙醇 20ml，浸渍 1 小时，滤过，取滤液 5ml，蒸干，残渣加水 10ml、盐酸 1ml，自“水浴上加热 30 分钟”起同法制成对照药材溶液。再取大黄酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》附录 VIB）试验，吸取供试品溶液 2 μ l、对照药材溶液和对照品溶液各 4 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 H 薄层板上，以石油醚（30-60℃）-甲酸乙酯-甲酸（15：5：1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干。置紫外光灯（365nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的 5 个橙色荧光斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙色荧光斑点；置氨蒸气中熏后，日光下检视，斑点变为红色。

【方剂出处】《中国药典》《金匱要略》《伤寒论》

【性状】本品为棕色的液体；味苦而涩。

【贮藏】密封。