

刺葵

拉丁学名：Phoenix

科属：棕榈科，刺葵属

形态特征：

盆栽高达 3-5 米。茎粗短，叶绿色，羽状全裂。裂片披针形，对称，先端尖。基部的羽片转化成刺。茎干上部顶生肉穗花序，小花无数。果实红棕色。羽状复叶，密生，长可达 6 米，拱形。总轴两侧有 100 多对小羽片。穗状花序，长达 1 米以上。花小，黄褐色。果实长椭圆形，熟时黄至淡红色。花期 5-7 月，果期 8-9 月。

习性：

原产加那利群岛。喜高温干燥和光线充足的环境，耐盐碱性强，忌积水。生长适宜温度为 15-25℃。要求轻质、排水良好的沙质土壤。喜多湿的热带气候，稍能耐寒。喜充足的阳光。在肥沃的土壤中生长快而粗壮，也能耐干旱、瘠薄的土壤。

刺葵，株高 1.5-3.0 米，单干直立。叶聚生于干顶，长 1.0-1.5 米，羽状全裂，深绿色，裂片狭长，初发出时为内合，以后销开，但不平展，下部小叶退化为针刺状，中上部羽叶柔软下垂，披散自然，具风流俊逸，飘柔潇洒之态，为棕榈类的特有景观。早期宜用中、小盆栽植，置台几、餐厅、会议室、候机室等处，装饰室内。大株宜用大盆栽植，作主会场、接待厅布景或陈列于门前两侧；亦宜地植于花坛中央、草坪四周或建筑物基础等处。同属的有软叶，长叶刺葵。

产地分布：

产于加那利群岛。我国引种栽培。

园林用途：

长叶刺葵树干高大雄伟，羽叶细裂而伸展，形成一密集的羽状树冠，颇显热带风光。

宜作行道树或园林绿化树种。小株可盆栽，作室内观叶植物。