

锦晃星

学名：Echeveria pulvinata

别名：金晃星、绒毛掌

科：景天科

属：石莲花属

产地分布

原产墨西哥。

形态特征

植株具分枝，细茎圆棒状，被有红棕色绒毛。肥厚、多肉的叶片倒披针形，呈莲座状互生于分枝上部，而栽培多年植株基部的叶片常脱落，叶片平展，绿色，表面密被白色、细短毫毛，在冷凉时期阳光充足的条件下，叶缘及叶片上部均呈深红色。穗状花序，小花钟形，花被绿色，也被有绒毛，内瓣橙红至红色，冬季和早春开放。

生长习性

宜凉爽、干燥和阳光充足的环境，耐干旱和半阴，忌水湿和闷热。生长期不宜浇水过多，盆土过湿，会造成茎、叶徒长，叶片之间的距离拉长，植株不紧凑，降低观赏价值。每 15-20 天施一次“低氮高磷、钾”的薄肥，施肥时注意肥水不要溅到叶片上，以免形成难看的斑痕，很难去掉。冬季放在室内阳光充足处，保持 6-8℃ 的温度，节制浇水，以防因低温、潮湿引起的烂根。盛夏高温时也不宜浇水过多，否则会因根部腐烂而造成叶片萎缩、脱落，并加强通风，防止暴雨冲淋。在半阴处能正常生长，但叶缘及叶端的红色会减退，甚至消失。每年春季翻盆一次，盆土要求疏松、排水良好。常用腐叶土、园土、粗沙各 1 份，混匀后使用，并加少量的骨粉作基肥。栽培 3-4 年以后的锦晃星，植株容易老化，应培育新苗对老株进行更新。

园林用途

锦晃星是一种栽培较为普遍的多肉植物，其肥厚、多肉的叶片布满了细短的白色毫毛，叶缘顶端的红色鲜艳夺目，与冬季和早春绽开出一串串橙红色小花交相辉映，异常美丽。盆栽点缀阳台、书桌、茶几，生动而有趣。锦司晃则较为稀有，多肉植物爱好者常作为品种收集、栽培。

繁殖培育

锦晃星的繁殖可在生长期进行扦插，枝插、叶插均可成活。枝插一般切取带有叶片的顶枝，长 10 厘米左右，插于沙土中，10-15 天即可生根；叶插是将叶片切下，待切口晾干后，插入或平卧在沙床上，保持稍有潮气，20 天左右生根。叶插较为困难，常切取旁生的幼株进行扦插。