

中缅木莲

学名: *Manglietia hookeri*

科属: 木兰科木莲属

形态特征: 大乔木, 高可达 25 米, 幼嫩部分被灰白色或淡褐色平伏柔毛。中缅木莲叶披针形、长圆状倒卵形或狭倒卵形, 长 20-30 厘米, 宽 6-10 厘米, 先端急尖或短渐尖, 基部楔形, 两面无毛; 侧脉每边 16-20 条, 网脉干时两面均凸起; 叶柄长 3-5 厘米; 中缅木莲托叶痕钝三角形, 长 2-3 厘米。中缅木莲花白色, 盛开时直径约 10 厘米, 花被片 9-12, 外轮 3 片基部绿色, 上部乳白色, 倒卵状长圆形, 长 6-8 厘米, 宽 2.5-3 厘米, 中内 2 轮厚肉质, 倒卵形或匙形, 长 6-8 厘米, 宽 1.5-2.5 厘米, 基部狭长成爪。中缅木莲在离花被 5-10 毫米处有苞片脱落痕。聚合果卵状长圆体形或近圆柱形, 平滑, 无瘤点突起, 长 7-10 厘米, 直径 6 厘米, 约有百枚以上蓇葖; 蓇葖露出面菱形, 具短喙, 背缝开裂, 具 1-4 种子。中缅木莲花期 4-5 月, 果期 9 月。

产地及分布: 产于中国云南省(西双版纳、景东)、贵州省(望谟)。生于海拔 1400-3000 米的山坡密林中。缅甸也有中缅木莲分布。中缅木莲为优良观赏树种及造林树种。